

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 28-3-84336248

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGO -

☎ (95) 36.05.70



Edition Speciale Corse


Bulletin Technique n° 28

du 22 Mars 1948.

VIGNE

. Cicadelle de la Flavescence dorée.

Le traitement des œufs de cette cicadelle pourra être effectué au stade B avec un produit à base d'oléoparathion et en mouillant bien les ceps jusqu'au sol.



B


. Excoriose.

Si le traitement d'hiver à l'arsenite de soude n'a pas pu être réalisé dans les parcelles atteintes d'Excoriose, on peut :

- soit effectuer 2 applications, la première lorsque 50 % des bourgeons ont atteint le stade D et la seconde lorsque 50 % des bourgeons ont atteint le stade E.

Bourgeon dans le coton

Suit de près le début des « pleurs ». Bourgeon gonflé dont les écailles s'écartent, protection colonneuse brunâtre très visible.



C

Pointe verte

Oeil continuant à gonfler et à s'allonger, jusqu'à présenter la pointe verte constituée par la jeune pousse.



D

Sortie des feuilles

Apparition des feuilles rudimentaires rassemblées en rosette, dont la base est encore protégée par la « bourre », progressivement rejetée hors des écailles.



E

Feuilles étalées

Premières feuilles totalement dégagées présentant les caractères variétaux. Sarment herbacé nettement visible.

Les produits utilisables sont à base de matières actives suivantes : Dichlofluanide (Euparène), Dithianon (Delan), Métirame de zinc (Polyram), Propinèbe (Antracol), Folpel (Nombreuses spécialités), Mancozèbe (N. S.), Manèbe (N.S.), Cymoxanil (N.S.), ainsi que leurs associations.

- soit réaliser 1 seule application lorsque 50 % des bourgeons sont au stade D avec un produit à base de Phosethyl d'aluminium (Rhodax, Mikal).

78

.../...

OLIVIER S

. Cochenille noire, Fumagine et Cycloconium.

Après la taille, vers la fin Mars - début Avril, on interviendra avec le mélange suivant :

- 2 litres d'huile d'été (Seppic été) - facultatif.
- 40 g/hl de Méthidathion (Ultracide 20)
- 250 g de cuivre métal/hl.

La pulvérisation sera copieuse afin de bien mouiller les feuilles.

ARBRES FRUITIERS

*** Cloque du pêcher.**

Les conditions climatiques sont très favorables au développement de la maladie, qui se trouve présente déjà dès le dégagement des premières petites feuilles.

Renouveler la protection avec l'un des produits cités dans le bulletin N° 25 du 3/02/1984.

*** Moniliose de l'Abricotier.**

Assurer la protection sur les variétés sensibles pendant la floraison. (voir bulletin N° 27 du 6/03/84).
